

VORKURS

26.05.2015

Wiederholung

Diese Fragen sollten Sie ohne Skript beantworten können:

- ✓ Was können Sie durch die Art des Logarithmus erkennen?
- ✓ Wie ziehen Sie einen Logarithmus max. auseinander?
- ✓ Worin liegt der Unterschied zwischen LOG und LN?
- ✓ Wie lautet der Definitionsbereich von $\text{Log}(x-1)$?
- ✓ Wie lautet die Umkehrfunktion von $\text{LD}(x)$?
- ✓ Wie können Sie einen LD eliminieren?
- ✓ Aus welchen 3 Schritten besteht das Lösen von Log-Ausdrücken?
- ✓ Wie machen Sie eine Basis passend?

AUFGABEN ZU LOGARITHMUS

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit als möglich.

$$1) \quad \log \frac{1}{100} - \sqrt{e^{\ln 4}} + 4^{\lg 3} - 2 \lg 0,25$$


$$2) \quad 100^{\log 3} - \ln \frac{1}{e^2} + 0,5 \lg 16 - e^{-3 \ln \frac{1}{2}}$$

$$3) \quad \left(\frac{1}{8}\right)^{\lg 2} - 6 \ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} + \frac{1}{4} \lg 64 - \frac{1}{2} \log \frac{1}{1000} + \sqrt[3]{e^{\ln 27}}$$


$$4) \quad \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^{\ln \frac{1}{9}} + 100^{\log \frac{1}{2^{-2}}} - 16^{\frac{1}{2} \lg 4} + 2 \log 0,001 - 3 \ln \frac{1}{e^3} + \frac{1}{4} \lg \frac{1}{256}$$

FUNKTIONSGRAPHEN

Positiver Logarithmus:



Negativer Logarithmus:



➤ Ausschließlich positive Steigung

➤ Ausschließlich negative Steigung

➤ Gemeinsamer Punkt: (1/0)

➤ Je größer die Basis, desto flacher ab $x=1$

➤ Je größer die Basis, desto steiler vor $x=1$

DEFINITIONS-/ WERTEBEREICH

Definitionsbereich:

Wie man schon durch die Funktionsgraphen erkennen kann, darf man einen Logarithmus nur von positiven Zahlen ziehen.

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} = \mathbb{R}^+$, da $10^x > 0 \Leftrightarrow \log(> 0) = x$ gilt.

Beispiel: $\ln(x^2 - 5x + 6) = y$
 $(x^2 - 5x + 6) = (x - 3) \cdot (x - 2) > 0$ } $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3 \vee x < 2\}$

Wertebereich:

Aufgrund der Funktionsgraphen ist ersichtlich, dass ein Logarithmus alle reellen Werte annehmen kann.

$W = y \in \mathbb{R}$, da $10^{(>0)} > 1 \wedge 10^{(\leq 0)} \leq 1$ gilt.

Beispiel: $12 - 3 \cdot \ln(5x - 3) = y$
 $12 - 3 \cdot]-\infty; \infty[\Rightarrow \mathbb{R}$ } $W = y \in \mathbb{R}$

DIE LOGARITHMEN-GLEICHUNG

Sofern eine reine Logarithmengleichung existiert kann man diese mit der folgenden Methodik lösen, wobei primäres Ziel eine Isolierung des Logarithmus auf beiden Seiten der Gleichung ist:

Methodik:

1. Die Faktoren vor dem Logarithmus in den Exponenten verschieben.
2. Alle positiven Terme über den Bruchstrich, alle negativen darunter schreiben.
3. Streichen der Logarithmen auf beiden Seiten.
4. Lösen der Gleichung.

$$\textit{Beispiel: } 2 \cdot \log x - 3 \cdot \log 2 - \frac{1}{2} \cdot \log x^4 = 2 \cdot \log 4 - \log(x - 2)$$

$$\log x^2 - \log 2^3 - \log(x^4)^{\frac{1}{2}} = \log 4^2 - \log(x - 2)$$

$$\log \frac{x^2}{8 \cdot x^2} = \log \frac{16}{x - 2}$$

$$\frac{x^2}{8 \cdot x^2} = \frac{16}{x - 2} \Leftrightarrow x - 2 = 16 \cdot 8 = 128 \Leftrightarrow x = 130$$

AUFGABEN ZU LOGARITHMUS

I. Bestimmen Sie bei den folgenden Ausdrücken die Lösungsmenge.

$$1) \quad 3 \cdot \log x - 4 \cdot \log \frac{2}{x} - \frac{1}{3} \cdot \log(x^2)^6 = \frac{2}{3} \cdot \log 27 + \frac{1}{2} \cdot \log x^4 - 2 \cdot \log 6$$

$$2) \quad 3 \cdot \ln 4 - 0,5 \cdot \ln \frac{16}{x^4} + 2 \cdot \ln 8 = 1,5 \cdot \ln x^4 - 8 \cdot \ln \sqrt[4]{\frac{1}{x}} - 2 \cdot \ln \frac{1}{4}$$

II. Berechnen Sie bei den folgenden Funktionen den Definitions- und Wertebereich.

$$3) \quad f(x) = \frac{2}{5} \cdot \ln(4x - 3 - x^2) \quad 4) \quad g(x) = 42 + \log(2 - \sqrt{x-2}) \quad 5) \quad h(x) = \frac{42}{\lg(3 \cdot x + 6)}$$

III. Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit als möglich.

$$1) \quad \log \frac{1}{1000} - 4 \ln \sqrt{e} + 16^{\lg \sqrt{3}} + 2e^{2 \cdot \ln 3} - (10^{\log 12} + 2 \lg 4)$$

$$2) \quad 6 \cdot \log \sqrt[3]{10} + 4^{\lg 3} - 2 \cdot \ln \frac{1}{e^2} - 0,2 \cdot \lg(32^5) + \left(\frac{1}{100}\right)^{\log \frac{1}{3}} - (\sqrt{e})^{\ln(5^4)}$$

Welche neuen Begriffe habe ich kennen gelernt?